

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΑΕ

Προετοιμασία

- Εκτίμηση αεραγωγού
- Προκινητικά και αντιόξινα
- Σχεδιάστε τον εξοπλισμό για δύσκολη αποτυχημένη
- Συζητήστε με τη μαιευτική ομάδα αν θα ξυπνήσετε ή θα προχωρήσετε αν χρειαστεί

Εξοπλισμός

- Τροχήλατο **δύσκολου αεραγωγού** διαθέσιμο

ΒΛΕΠΕ:

Difficult airway trolley

Εισαγωγή στην Αναισθησία

- Πλήρης προοξυγόνωση ώστε EtO₂ 0.9 - σε θέση ράμπας - παράλληλη ρινική οξυγόνωση
- Ταχεία εισαγωγή
- Εφαρμογή/άρση πίεσης κρικοειδούς
- Εξασφάλιση κατάλληλων δόσεων φαρμάκων
- ✓ προποφόλη 2,5 mg/kg
- ✓ Νευρομυικός αποκλεισμός:
 - 1,2mg/kg rocuronium
 - 1,5 mg/kg suxamethonium
- Σκεφτείτε αερισμό με μάσκα προσώπου (<20cmH₂O)

ΒΛΕΠΕ:

Anticipated difficult airway during obstetric general anaesthesia: narrative literature review and management recommendations.

Management of difficult and failed intubation in obstetrics guidelines

Αναμενόμενος Δύσκολος Αεραγωγός

- Προγραμματισμένη ΚΤ ώστε να γίνει **περιοχική αναισθησία (CSE)** για αποφυγή αντιμετώπισης σε επείγουσα βάση ή σε ώρες εφημερίας
- Διασφαλίζεται διαθεσιμότητα εξοπλισμού δύσκολου αεραγωγού
- Ενημερώνεται δεύτερος αναισθησιολόγος



Σκέψη για **ξυπνητή διασωλήνωση** με ινοπτικό ή βίντεο εφόσον η ασθενής κατανοεί και συνεργάζεται

1^η προσπάθεια > η καλύτερη προσπάθεια
Σκέψου
videolaryngoscope

Μη αναμενόμενος Δύσκολος Μαιευτικός Αεραγωγός

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΑΕ

Προετοιμασία για Γενική Αναισθησία (ΓΑ)

Εισαγωγή στη ΓΑ (ΠΡΟΟΞΥΓΩΝΩΣΗ+ RSI +ΠΙΕΣΗ/ΑΡΣΗ ΚΡΙΚΟΕΙΔΟΥΣ)

PLAN A: ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

Μέγιστο 2 προσπάθειες – 3^η ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ
(συνιστάται VDL – βιντεολαρυγγοσκόπηση)

Επιτυχής διασωλήνωση

Επιβεβαίωση με
καπνογραφία

**Συνέχιση
χειρουργείου**

Αποτυχία → **ΖΗΤΗΣΕ ΒΟΗΘΕΙΑ!!!**

PLAN B

Τοποθέτηση υπεργλωττιδικής
συσκευής 2^{ης} γενιάς
Επαρκής οξυγόνωση????

ΝΑΙ

**ΑΠΟΦΑΣΗ: Προχωρήστε
ή ξυπνήστε την επίτοκο**

ΟΧΙ

ΒΛΕΠΕ:

[Anticipated difficult airway during obstetric general anaesthesia: narrative literature review and management recommendations.](#)
[Management of difficult and failed intubation in obstetrics guidelines](#)

Μεταθανάτια ΚΤ εντός
4 λεπτών

eFONA
(Bougie – Νυστέρι Νο10- ET Νο 6)

CICO
(Cannot intubate – Cannot
oxygenate)

PLAN C

- Απέκλεισε λαρυγγόσπασμο
- Βεβαιώσου για επαρκή νευρομυϊκό αποκλεισμό